

## TABLEAU DE COMPRESSION DÉGRESSIVE

	<i>Symptômes/Indications</i>	<i>Compression à la cheville (mmHg)</i>
CEAP 0/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Position debout ou assise prolongée (voyage)</li> <li>Prévention (grossesse, facteurs de risque)</li> </ul>	15-20 mmHg
CEAP 1/S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jambes lourdes, fatiguées</li> </ul>	
CEAP 1/S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jambes endolories, fatiguées</li> <li>Télangiectasies/œdème léger (grossesse, âge, voyage, etc.)</li> <li>Post-sclérothérapie de petites veines</li> </ul>	20-30 mmHg
CEAP 2/S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varices légères à modérées</li> <li>Chirurgie élective (sclérothérapie, phlébectomie, éveinage, orthopédie)</li> </ul>	
CEAP 3/S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orthostatisme/hypotension orthostatique</li> <li>Œdème modéré / grave (grossesse, facteurs de risque)</li> <li>Chirurgie orthopédique, post-fracture, oedème post-traumatique, sclérothérapie, etc.</li> </ul>	30-40 mmHg
CEAP 4/S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Changements cutanés sans ulcération</li> <li>Phlébite superficielle</li> <li>Traitement de thrombose veineuse profonde/ Syndrome post-thrombotique</li> </ul>	
CEAP 5/S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Changements cutanés avec ulcération guérie</li> </ul>	
CEAP 6/S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Changements cutanés avec ulcération active</li> </ul>	
CEAP 4/S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thrombose veineuse profonde grave / Syndrome post-thrombotique</li> </ul>	40-50 ou 50-60 mmHg
CEAP 5/S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Changements cutanés graves avec ulcération guérie (récurrente)</li> </ul>	
CEAP 6/S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Changements cutanés graves avec ulcération</li> </ul>	

CEAP [ C- Classification clinique / E- Classification étiologique  
A- Classification anatomique / P- Classification physiopathologique

## CONTRE-INDICATIONS

- Insuffisance artérielle, claudication intermittente, ischémie
- Insuffisance cardiaque non contrôlée
- Dermatite aiguë, dermatose suintante, sepsie cutanée

## AVERTISSEMENTS

- Signes d'infection
- Ulcération veineuse étendue
- Sensibilité de la peau ou allergies
- Neuropathie
- Diabète
- Confinement au lit ou utilisation non ambulatoire sauf prescription contraire du médecin